EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL
Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

SPECIALITATEA
STOMATOLOGIE

TEST-GRILĂ
DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

1-Contraindicațiile absolute ale extracției dentare sunt:
A - dinții cu raporturi sinusale
B - dinții incluși
C - leucemia acută și Infarctul miocardic recent

2-Formarea tartrului dentar presupune:
A - microorganismele plăcii dentare necesită pH alcalin
B - nu este favorizat de prezența bacteriilor
C - mineralizarea plăcii dentare mature

3-Tuberculul piriform ocupă:
A - zona premolarilor mandibulari
B - regiunea molarului de minte inferior
C - zona centrală a bolții palatine

4-Adeziunea la proteza totală depinde de:
A - întinderea suprafeței plane orizontale cu care vine în contact proteza
B - mărimea tuberozităților maxilare
C - volumul crestelor edentate

5-Spasmul glotic poate fi provocat de:
A - intoxicații cu substanțe convulsivante
B - proteze dentare deplasate sau rupte
C - înec

6-Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică:
A - pe o perioadă de 6 luni
B - până la realizarea numărului minim de credite
C - pe o perioadă de 12 luni

7-Zona de sprijin a câmpului protetic mandibular este reprezentată de:
A - bolta palatină
B - creasta edentată
C - tuberozitatea maximală

8-Precizați care variantă este adevărată din următoarele enunțuri:
A - între specialiștii medico-sanitari, informațiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient nu trebuie să fie comunicate
B - asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical nu sunt obligați să asigure îngrijirile de sănătate și tratamentele prescrise pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA
C - păstrarea confidențialității asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere și/sau tratament astfel de persoane

9-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - nu dau metastaze
B - evoluție lentă
C - anatomo-clinic prezintă creștere continuă

10-Clinic, tartrul se poate prezenta:
A - este mai puțin aderent ca tartrul supragingival
B - tartrul subgingival descoperit pe suprafețele dentare care participă la constituirea șanțurilor gingivale și a pungilor parodontale
C - este mai puțin dur ca tartrul supragingival

11-Informațiile cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale:
A - nu există obligația de transmitere a acestor informații
B - se transmit autorităților competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene prin alertă în cadrul IMI
C - se transmit Ministerului Sănătății

12-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - evoluție lentă
B - recidivează local sau la distanță prin metastază
C - sunt încapsulate

13-Constituie încălcare a regulilor etice:
A - înscrierea intr-o organizație sindicală
B - aprecierile în public sau pe rețelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în scopul de a induce în eroare opinia publică
C - nerespectarea programului de lucru

14-Care este autoritatea ce recunoaște calificările profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană:
A - Ministerul Sănătății
B - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
C - Ministerul Muncii

15-Câmpul protetic edentat total este format din:
A - zona de succiune
B - mucoasa pasiv mobilă
C - mucoasa mobilă

16-Zdrobirea procesului alveolar necesită:
A - rezecția apicală
B - reducerea manuală a fracturii și tratamentul luxațiilor dentare asociate, control periodic
C - extracția dentară a dintelui permanent

17-Care este prima manoperă întreprinsă în insuficiența respiratorie:
A - asigurarea și menținerea libertății căilor respiratorii
B - respirație artificială
C - oxigenoterapie

18-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - sunt bine delimitate
B - invadează țesuturile vecine
C - nu au plan de clivaj

19-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - evoluție rapidă
B - sunt încapsulate
C - nu dau metastaze

20-Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:
A - consum redus, rar, de glucide
B - prezența pH-urilor neutre
C - prezența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular

21-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - evoluție lentă
B - invadează țesuturile vecine
C - recidivează după extirpare

22-Mucoasa pasiv-mobilă de închidere marginală are:
A - o lățime între 1-3 mm
B - o lățime între 4-6 mm
C - o lățime între 2-4 mm

23-Insulina se păstrează:
A - în congelator
B - la rece (în frigider)
C - în dulap de medicamente dar ferit de lumină

24-Sterilizarea urmărește:
A - distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate și a virusurilor
B - dezinfecția căzilor, băilor, ploștilor
C - profilaxia infecțiilor plăgilor operatorii

25-Indicația anesteziei nervului bucal interesează:
A - anestezia limbii și a planșeului bucal
B - anestezia completă pentru mucoasa gingivo-alveolară vestibulară situată distal de gaura mentonieră
C - anestezia limbii

26-Indicația de Traheostomie vizează:
A - în intoxicațiile voluntare
B - tratarea infecțiilor pleuro-pulmonare
C - traumatismele toracice cu fracturi costale multiple și volet costal

27-Contraindicațiile rezecției apicale vizează:
A - dinții pluriradiculari
B - premolarii maxilari
C - dinții cu implantare compromisă

28-Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor este dată de:
A - ingestia redusă de alimente îndulcite cu zahăr
B - absența plăcii bacteriene
C - flux salivar redus

29-Traumatismele deonto-parodontale ale dinților permanenți- Luxația laterală, necesită:
A - șlefuirea coronară
B - reducerea manuală în poziție corectă
C - rezecția apicală

30-Fractura radiculară a dinților permanenți; fractura verticală necesită:
A - extracția
B - rezecția apicală
C - remodelarea coronară (coronoplastia)

31-Îndepărtarea plăcii dentare se poate face:
A - prin clătire
B - placa dentară nu se îndepărtează prin clătire
C - prin proiectarea jetului de apă

32-Indicațile rezecției apicale pot fi:
A - în fractura radiculară în 1/3 cervicală
B - în canale cu curburi accentuate
C - în abraziunea coronară accentuată

33-Câmpul protetic edentat total este format din:
A - zona de sprijin
B - mucoasa pasiv mobilă
C - mucoasa mobilă

34-Indicațiile extracției dinților permanenți sunt în:
A - distrucții corono-radiculare avansate
B - fracturi coronare cu afectarea camerei pulpare
C - distrucții corono-radiculare reduse

35-Buza de iepure reprezintă:
A - despicătura cerului gurii și a vălului palatin
B - despicătura parțială a vălului palatin
C - despicătura numai a buzei superioare

36-Siliconii de adiție au cele mai mici modificări:
A - 0,41%
B - 0,15%
C - 0,20%

37-În tratamentul accidentelor extracției dentare-Luxația ATM:
A - nu se finalizează extracția dentară
B - continuarea tratamentului se va realiza în secții OMF
C - se practică reducerea luxației și imobilizarea de urgență a mandibulei

38-Chisturile părților moi orale-chistul dermoid presupune:
A - adiție osoasă
B - extirpare prin abordare orală/cutanată, în funcție de localizare
C - antibioterapie

39-Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt:
A - competența, corectitudinea și comunicarea
B - profesionalismul, cooperarea și empatia
C - experienta profesională, responsabilitatea și cinstea

40-Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:
A - când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
B - în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală
C - pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului

41-Depozitele dentare moi-pelicula dobândită:
A - reprezintă un depozit moale, subțire, format din glicoproteine de origine salivară
B - favorizează demineralizarea
C - împiedică menținerea umidității suprafețelor

42-Clinic, tartrul se poate prezenta:
A - tartrul supragingival, în treimea gingivală coronară, la frontali inferiori, lingual; la molarii superiori vestibular
B - culoarea la maturare a tartrului este alb-gălbuie
C - în zonele dentare expuse unei masticații intense

43-Indicațiile extracției dinților permanenți sunt în:
A - dinții care necesită tratament endodontic
B - luxația completă a dinților
C - dinții care au suferit extruzia și egresiunea

44-Mușchiul buccinător poate contribui la menținerea și stabilizarea protezei având:
A -fibre musculare oblice pe marginea protezei
B - fibre musculare paralele cu marginea protezei
C - fibre musculare perpendiculare pe marginea protezei

45-Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
A - nu permit reinserția amprentei în cavitatea bucală
B - nu aderă pe suprafețele uscate
C - stabilitate remarcabilă

46-Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor cariogene este dată de:
A - flux salivar crescut
B - absența plăcii bacteriene
C - ingestia frecventă de alimente îndulcite cu zahăr

47-Indicația anesteziei nervului mentonier și incisiv implică:
A - anestezia limbii
B - intervenții chirurgicale labio-mentoniere când anestezia locală prin infiltrație deformează regiunea
C - anestezia buzei superioare

48-Placa dentară generatoare de tartru dentar are următoarea caracteristică:
A - nu este influențată de alimentație
B - nu este influențată de controlul mecanic al plăcii
C - prin compoziția microbiană prezentă în placă pot fi generate cantități mari de tartru

49-Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
A - nu permit reinserția amprentei în cavitatea bucală
B - nu aderă pe suprafețele uscate
C - au rezistență suficient de mare după amprentare

50-Gura de lup constă în:
A - despicătura numai a buzei superioare
B - despicătura bolții palatine
C - despicătura buzei superioare și a cerului gurii

51-Placa dentară-aspecte clinice:
A - este influențată de tipul alimentelor consumate
B - nu este influențată de tipul de masticație
C - nu este influențată de mobilitatea părților moi

52-Parodontita este:
A - o inflamație a cavității bucale
B - o afecțiune a gingiilor
C - o boală care atacă țesuturile de susținere a dinților

53-Depozitarea medicamentelor se face în:
A - dulapuri speciale
B - noptiere
C - dulapuri compartimentate

54-Resuscitarea respiratorie este indicată în:
A - insuficiența respiratorie acută
B - congestia pulmonară
C - pleurezie

55-Indicațiile extracției dinților temporari sunt la:
A - dinți temporari fără mobilitate
B - dinți temporari care împiedică erupția celor permanenți
C - dinți temporari cu carii incipiente

56-Placa dentară cariogenă este favorizată de:
A - consumul de carbohidrați ce conduce la apariția pH-ului acid cu facilitatea demineralizării
B - prezența fluorului în structurile dentare ce facilitează demineralizarea
C - cantitatea scăzută de salivă (Xerostomia) ce scade efectul demineralizant

57-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în pungi de hârtie/plastic sigilate este de:
A - 48 ore
B - 2 luni
C - 1 săptămână

58-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în hârtie specială (ambalaj în două straturi de hârtie) este de:
A - 1 lună
B - 3 luni
C - 2 luni

59-Zona de sprijin a câmpului protetic maxilar este reprezentată de:
A - creasta edentată
B - linia oblică externă
C - linia oblică internă

60-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - nu sunt bine delimitate
B - nu interesează ganglionii limfatici
C - nu au plan de clivaj

61-Plastia șanțurilor periosoase la mandibulă se indică în:
A - șanțul vestibular adânc
B - fundul de sac lărgit
C - atrofia osoasă severă

62-Placa dentară - aspecte clinice:
A - nu este influențată de tipul de masticație
B - nu este influențată de tipul de alimente
C - se poate colora datorită fumatului și/sau aportului de medicamente

63-Indicația anesteziei nervului alveolar inferior (Spina Spix) interesează:
A - bolta palatină
B - aria inervată de nervul bucal
C - gingivomucoasa vestibulară pe o hemiarcadă

64-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - nu recidivează după extirpare
B - interesează ganglionii
C - evoluție rapidă, fulminantă

65-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - evoluție lentă
B - nu dau metastaze
C - invadează țesuturile

66-Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:
A - Ministerul Educației
B - Ministerul Sănătății
C - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

67-Care din elementele de mai jos nu le întâlnim în stomatite:
A - alterarea profundă a stării generale, Hipotensiune, stare de șoc
B - tumefacția mucoaselor
C - salivația abundentă

68-Sialolitiaza, submaxilectomia presupune:
A - instilații endo-canaliculare cu ser fiziologic
B - masaj local și stimularea reflexă a secreției salivare
C - calculi multipli, recidive frecvente

69-Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2008, cu modificările și completările ulterioare constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor :
A - altor acte normative
B - Codului administrativ
C - Codului penal

70-Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
A - aderă pe suprafețele uscate
B - nu permit reinserția amprentei în cavitatea bucală
C - au rezistență suficient de mare după amprentare

71-Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor este dată de:
A - flux salivar crescut
B - acumularea plăcii bacteriene
C - ingestia redusă de alimente îndulcite cu zahăr

72-Administrarea medicamentelor de către asistentul medical se face în condiții:
A - de igienă, asepsie, dezinfecție și menținerea normelor de control a infecțiilor
B - de igienă, asepsie și sterilizare
C - de dezinfecție

73-Avantajele sterilizării prin abur sub presiune sunt:
A - este cea mai puțin economică metodă de sterilizare
B - distruge rapid și eficient toate microorganismele, inclusiv sporii și virusurile
C - nu duce la corodarea instrumentelor metalice

74-Tulburările asociate erupției molarului de minte inferior pot fi:
A - deglutiția infantilă
B - flegmonul de planșeu oral
C - inocluzia sagitală la nivelul molarilor 3

75-Mucoasa fixă se află pe:
A - pe planșeul bucal
B - pe obraji
C - crestele edentate maxilare și mandibulare

76-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - interesează ganglionii
B - nu invadează țesuturile vecine
C - recidivează după extirpare

77-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - nu sunt bine delimitate
B - au evoluție lentă
C - nu recidivează

78-Indicația anesteziei nervului palatin mare afectează:
A - anestezia fibromucoasei palatinale
B - anestezia fibromucoasei palatinale în 2/3 anterioară
C - anestezia fibromucoasei palatinale în 2/3 posterioară

79-Placa dentară supragingivală reprezintă o:
A - depunere de placă pe suprafețe dentare lucioase
B - depunere de placă pe lucrări protetice plane, lucioase
C - depunere de placă favorizată de incongruența dento-alveolară cu înghesuire

80-Caracteristica plăcii dentare generatoare de boală parodontală constă în :
A - grosimea și maturizarea plăcii nu crește capacitatea ei patogenă
B - factorul etiologic local cel mai important în declanșarea și evoluția bolii parodontale este placa dentară
C - microorganismele plăcii nu acționează distructiv direct

81-Momentul optim de programare a pacientei însărcinate este:
A - se va programa dimineața
B - în primul trimestru al sarcinii
C - în cel de-al doilea trimestru al sarcinii

82-PLaca dentară-aspecte clinice:
A - nu este influențată de tipul alimentelor
B - se definește ca: depozitul dentar moale, neuniform și aderent la structurile cavității orale
C - se acumulează în zonele de autocurățire

83-Momentul optim de programare a pacientei însărcinate este:
A - în ultimul trimestru al sarcinii
B - se evită programarea în cursul dimineții
C - în primul trimestru al sarcinii

84-Sancțiunile disciplinare pe care consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:
A - suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă
B - retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei
C - mustrarea și avertismentul

85-Depozitul dentar dur-tartrul dentar:
A - generează, în mod obișnuit probleme parodontale
B - nu este un factor etiologic al inflamației gingivale
C - este un depozit dur, calcificat, neaderent de structura dură dentară

86-Prelungirea timpului de priză la alginate se poate face:
A - folosind apă caldă
B - folosind apă rece
C - spatulare îndelungată

87-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de:
A - 72 ore
B - 48 ore
C - 24 ore

88-Placa dentară are în compoziție chimică:
A - 80% apă și 20% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme
B - 20% apă și 80% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme
C - 60% apă și 20% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme

89-Extracția resturilor radiculare prin alveolotomie sunt la:
A - rădăcinile situate sub limita procesului alveolar
B - resturile radiculare care pot fi vizualizate pe fundul alveolei
C - rădăcinile situate profund intraalveolar

90-Placa dentară-compoziție chimică:
A - se compune din 20% apă și 80% substanță uscată
B - se compune din 60% apă și 40% substanță uscată
C - se compune din 80% apă și 20% substanță uscată

91-Câte picături are 1 (un) gram de soluție apoasă:
A - 40-50 picături
B - 60-65 de picături
C - 20-25 picături

92-Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
A - nu necesită izolarea înaintea turnării modelului
B - nu aderă pe suprafețele uscate
C - nu permit reinserția amprentei în cavitatea bucală

93-Provocarea hipoglicemiei poate fi atribuită:
A - unei doze prea mari de insulină
B - unui aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dietă
C - unei doze insulină mai mică decât cea prescrisă

94-Compoziția tartrului dentar este:
A - substanțe anorganice 8%, substanțe organice 75-85% și apă 15%
B - substanțe anorganice 15%, substanțe organice 75-85% și apă 8%
C - substanțe anorganice 75-85%, substanțe organice 15% și apă 8%

95-Garoul elastic se aplică deasupra locului puncției, la aproximativ:
A - 20 cm
B - 5 cm
C - 10 cm

96-Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:
A - absența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular
B - prezența pH-urilor acide
C - consum redus, rar, de glucide

97-Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:
A - prezența pH-urilor neutre
B - absența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular
C - consumul frecvent de glucide

98-Zona de succiune sau de închidere marginală este realizată de:
A - mucoasa de trecere între mucoasa fixă și mobilă
B - mucoasa mobilă
C - mucoasa fixă

99-Placa subgingivală:
A - este influențată de prezența abundentă a salivei
B - este favorizată de prezența lichidului crevicular (sulcular)
C - se localizează în vecinătatea festonului gingival pe care îl inflamează

100-Fracturile complexului zigomatico-alveolar fără deplasare necesită:
A - supraveghere, expectativă
B - reducerea transgeniană
C - reducerea prin abord cutanat