EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL
Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

SPECIALITATEA
ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

TEST-GRILĂ
DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

1-Sancțiunile disciplinare pe care consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:
A - retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei
B - suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă
C - mustrarea și avertismentul

2-Garoul elastic se aplică deasupra locului puncției, la aproximativ:
A - 20 cm
B - 10 cm
C - 5 cm

3-Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor cariogene este dată de:
A - absența plăcii bacteriene
B - ingestia frecventă de alimente îndulcite cu zahăr
C - flux salivar crescut

4-Contraindicațiile absolute ale extracției dentare sunt:
A - dinții incluși
B - leucemia acută și Infarctul miocardic recent
C - dinții cu raporturi sinusale

5-Placa subgingivală:
A - este influențată de prezența abundentă a salivei
B - se localizează în vecinătatea festonului gingival pe care îl inflamează
C - este favorizată de prezența lichidului crevicular (sulcular)

6-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - recidivează local sau la distanță prin metastază
B - evoluție lentă
C - sunt încapsulate

7-Caracteristica plăcii dentare generatoare de boală parodontală constă în:
A - factorul etiologic local cel mai important în declanșarea și evoluția bolii parodontale este placa dentară
B - grosimea și maturizarea plăcii nu crește capacitatea ei patogenă
C - microorganismele plăcii nu acționează distructiv direct

8-Indicația de Traheostomie vizează:
A - în intoxicațiile voluntare
B - traumatismele toracice cu fracturi costale multiple și volet costal
C - tratarea infecțiilor pleuro-pulmonare

9-Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor este dată de:
A - absența plăcii bacteriene
B - ingestia redusă de alimente îndulcite cu zahăr
C - flux salivar redus

10-Placa dentară - aspecte clinice:
A - nu este influențată de tipul de masticație
B - nu este influențată de tipul de alimente
C - se poate colora datorită fumatului și/sau aportului de medicamente

11-Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașa și de asistent medical sunt:
A - profesionalismul, cooperarea și empatia
B - experienta profesională, responsabilitatea și cinstea
C - competența, corectitudinea și comunicarea

12-Sterilizarea urmărește:
A - dezinfecția căzilor, băilor, ploștilor
B - distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate și a virusurilor
C - profilaxia infecțiilor plăgilor operatorii

13-Traumatismele deonto-parodontale ale dinților permanenți- Luxația laterală, necesită:
A - șlefuirea coronară
B - rezecția apicală
C - reducerea manuală în poziție corectă

14-Depozitul dentar dur-tartrul dentar:
A - nu este un factor etiologic al inflamației gingivale
B - generează, în mod obișnuit probleme parodontale
C - este un depozit dur, calcificat, neaderent de structura dură dentară

15-Formarea tartrului dentar presupune:
A - mineralizarea plăcii dentare mature
B - nu este favorizat de prezența bacteriilor
C - microorganismele plăcii dentare necesită pH alcalin

16-În tratamentul accidentelor extracției dentare-Luxația ATM:
A - nu se finalizează extracția dentară
B - se practică reducerea luxației și imobilizarea de urgență a mandibulei
C - continuarea tratamentului se va realiza în secții OMF

17-În hipertensiunea arterială, atitudinea terapeutică este:
A - întreruperea tratamentului stomatologic
B - așezarea pacientului în poziție culcat
C - nu se administrează oxigen

18-Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:
A - Ministerul Sănătății
B - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
C - Ministerul Educației

19-Fracturile complexului zigomatico-alveolar fără deplasare necesită:
A - supraveghere, expectativă
B - reducerea prin abord cutanat
C - reducerea transgeniană

20-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în hârtie specială (ambalaj în două straturi de hârtie) este de:
A - 1 lună
B - 2 luni
C - 3 luni

21-Mucoasa fixă se află pe:
A - crestele edentate maxilare și mandibulare
B - pe planșeul bucal
C - pe obraji

22-Placa dentară are în compoziție chimică:
A - 20% apă și 80% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme
B - 80% apă și 20% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme
C - 60% apă și 20% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme

23-Fractura radiculară a dinților permanenți; fractura verticală necesită:
A - rezecția apicală
B - remodelarea coronară (coronoplastia)
C - extracția

24-Placa dentară-aspecte clinice:
A - nu este influențată de tipul de masticație
B - nu este influențată de mobilitatea părților moi
C - este influențată de tipul alimentelor consumate

25-Gura de lup constă în:
A - despicătura buzei superioare și a cerului gurii
B - despicătura bolții palatine
C - despicătura numai a buzei superioare

26-Clinic, tartrul se poate prezenta:
A - este mai puțin dur ca tartrul supragingival
B - este mai puțin aderent ca tartrul supragingival
C - tartrul subgingival descoperit pe suprafețele dentare care participă la constituirea șanțurilor gingivale și a pungilor parodontale

27-Indicația anesteziei nervului bucal interesează:
A - anestezia completă pentru mucoasa gingivo-alveolară vestibulară situată distal de gaura mentonieră
B - anestezia limbii
C - anestezia limbii și a planșeului bucal

28-Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:
A - prezența pH-urilor neutre
B - consumul frecvent de glucide
C - absența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular

29-Depozitarea medicamentelor se face în:
A - dulapuri speciale
B - dulapuri compartimentate
C - noptiere

30-Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică:
A - pe o perioadă de 6 luni
B - până la realizarea numărului minim de credite
C - pe o perioadă de 12 luni

31-Indicația anesteziei nervului palatin mare afectează:
A - anestezia fibromucoasei palatinale în 2/3 anterioară
B - anestezia fibromucoasei palatinale în 2/3 posterioară
C - anestezia fibromucoasei palatinale

32-Adeziunea la proteza totală depinde de:
A - mărimea tuberozităților maxilare
B - întinderea suprafeței plane orizontale cu care vine în contact proteza
C - volumul crestelor edentate

33-Parodontita este:
A - o boală care atacă țesuturile de susținere a dinților
B - o inflamație a cavității bucale
C - o afecțiune a gingiilor

34-Sialolitiaza, submaxilectomia presupune:
A - instilații endo-canaliculare cu ser fiziologic
B - calculi multipli, recidive frecvente
C - instilații endo-canaliculare cu ser fiziologic

35-Indicațiile extracției dinților permanenți sunt în:
A - dinții care au suferit extruzia și egresiunea
B - dinții care necesită tratament endodontic
C - luxația completă a dinților

36-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - recidivează după extirpare
B - interesează ganglionii
C - nu invadează țesuturile vecine

37-Buza de iepure reprezintă:
A - despicătura cerului gurii și a vălului palatin
B - despicătura numai a buzei superioare
C - despicătura parțială a vălului palatin

38-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - sunt bine delimitate
B - invadează țesuturile vecine
C - nu au plan de clivaj

39-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de:
A - 72 ore
B - 48 ore
C - 24 ore

40-Indicația anesteziei nervului alveolar inferior (Spina Spix) interesează:
A - gingivomucoasa vestibulară pe o hemiarcadă
B - aria inervată de nervul bucal
C - bolta palatină

41-Extracția resturilor radiculare prin alveolotomie sunt la:
A - resturile radiculare care pot fi vizualizate pe fundul alveolei
B - rădăcinile situate sub limita procesului alveolar
C - rădăcinile situate profund intraalveolar

42-Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor este dată de:
A - ingestia redusă de alimente îndulcite cu zahăr
B - acumularea plăcii bacteriene
C - flux salivar crescut

43-Spasmul glotic poate fi provocat de:
A - înec
B - intoxicații cu substanțe convulsivante
C - proteze dentare deplasate sau rupte

44-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - nu sunt bine delimitate
B - nu au plan de clivaj
C - nu interesează ganglionii limfatici

45-Compoziția tartrului dentar este:
A - substanțe anorganice 15%, substanțe organice 75-85% și apă 8%
B - substanțe anorganice 8%, substanțe organice 75-85% și apă 15%
C - substanțe anorganice 75-85%, substanțe organice 15% și apă 8%

46-Plastia șanțurilor periosoase la mandibulă se indică în:
A - fundul de sac lărgit
B - șanțul vestibular adânc
C - atrofia osoasă severă

47-Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
A - nu permit reinserția amprentei în cavitatea bucală
B - nu necesită izolarea înaintea turnării modelului
C - nu aderă pe suprafețele uscate

48-Îndepărtarea plăcii dentare se poate face:
A - prin proiectarea jetului de apă
B - Placa dentară nu se îndepărtează prin clătire
C - prin clătire

49-Provocarea hipoglicemiei poate fi atribuită:
A - unui aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dietă
B - unei doze insulină mai mică decât cea prescrisă
C - unei doze prea mari de insulină

50-Momentul optim de programare a pacientei însărcinate este:
A - în primul trimestru al sarcinii
B - se evită programarea în cursul dimineții
C - în ultimul trimestru al sarcinii

51-Siliconii de adiție au cele mai mici modificări:
A - 0,41%
B - 0,15%
C - 0,20%

52-Indicația anesteziei nervului mentonier și incisiv implică:
A - intervenții chirurgicale labio-mentoniere când anestezia locală prin infiltrație deformează regiunea
B - anestezia buzei superioare
C - anestezia limbii

53-Care este autoritatea ce recunoaște calificările profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană:
A - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
B - Ministerul Muncii
C - Ministerul Sănătății

54-Prelungirea timpului de priză la alginate se poate face:
A - folosind apă caldă
B - spatulare îndelungată
C - folosind apă rece

55-Resuscitarea respiratorie este indicată în:
A - pleurezie
B - congestia pulmonară
C - insuficiența respiratorie acută

56-Mușchiul buccinător poate contribui la menținerea și stabilizarea protezei având:
A - fibre musculare paralele cu marginea protezei
B - fibre musculare perpendiculare pe marginea protezei
C - fibre musculare oblice pe marginea protezei

57-Placa dentară cariogenă este favorizată de:
A - cantitatea scăzută de salivă (Xerostomia) ce scade efectul demineralizant
B - consumul de carbohidrați ce conduce la apariția pH-ului acid cu facilitatea demineralizării
C - prezența fluorului în structurile dentare ce facilitează demineralizarea

58-Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:
A - pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului
B - când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
C - în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală

59-Indicațile rezecției apicale pot fi:
A - în fractura radiculară în 1/3 cervicală
B - în canale cu curburi accentuate
C - în abraziunea coronară accentuată

60-Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
A - nu aderă pe suprafețele uscate
B - stabilitate remarcabilă
C - nu permit reinserția amprentei în cavitatea bucală

61-Zdrobirea procesului alveolar necesită:
A - extracția dentară a dintelui permanent
B - reducerea manuală a fracturii și tratamentul luxațiilor dentare asociate, control periodic
C - rezecția apicală

62-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - invadează țesuturile
B - evoluție lentă
C - nu dau metastaze

63-Placa dentară supragingivală reprezintă o:
A - depunere de placă favorizată de incongruența dento-alveolară cu înghesuire
B - depunere de placă pe suprafețe dentare lucioase
C - depunere de placă pe lucrări protetice plane, lucioase

64-Indicațiile extracției dinților permanenți sunt în:
A - distrucții corono-radiculare reduse
B - distrucții corono-radiculare avansate
C - fracturi coronare cu afectarea camerei pulpare

65-Care din elementele de mai jos nu le întâlnim în stomatite:
A - tumefacția mucoaselor
B - salivația abundentă
C - alterarea profundă a stării generale, Hipotensiune, stare de șoc

66-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - invadează țesuturile vecine
B - recidivează după extirpare
C - evoluție lentă

67-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - nu sunt bine delimitate
B - au evoluție lentă
C - nu recidivează

68-În astmul bronșic, atitudinea terapeutică este:
A - continuarea tratamentului stomatologic
B - consult de specialitate
C - întreruperea medicației de fond

69-Creșterea osoasă a scheletului facial se realizează:
A - la maxilar în jos și înapoi
B - la mandibulă în sus și înapoi
C - perpendicular pe direcția suturilor (sincondrozelor)

70-Tulburările asociate erupției molarului de minte inferior pot fi:
A - deglutiția infantilă
B - inocluzia sagitală la nivelul molarilor 3
C - flegmonul de planșeu oral

71-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - sunt încapsulate
B - nu dau metastaze
C - evoluție rapidă

72-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în pungi de hârtie/plastic sigilate este de:
A - 2 luni
B - 48 ore
C - 1 săptămână

73-Arcul vestibular periferic este realizat:
A - din sârmă de wipla cu diametru 0,6-0,6 mm mai puțin elastică
B - din sârmă de wipla cu diametru 0,6-1 mm mai puțin elastică
C - din sârmă de wipla cu diametru 0,6-0,8 mm, foarte elastică

74-Depozitele dentare moi-pelicula dobândită:
A - împiedică menținerea umidității suprafețelor
B - favorizează demineralizarea
C - reprezintă un depozit moale, subțire, format din glicoproteine de origine salivară

75-Tumorile maligne au caracteristici generale:
A - evoluție lentă
B - anatomo-clinic prezintă creștere continuă
C - nu dau metastaze

76-Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
A - Au rezistență suficient de mare după amprentare
B - Nu permit reinserția amprentei în cavitatea bucală
C - Aderă pe suprafețele uscate

77-Constituie încălcare a regulilor etice:
A - nerespectarea programului de lucru
B - înscrierea intr-o organizație sindicală
C - aprecierile în public sau pe rețelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în scopul de a induce în eroare opinia publică

78-Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2008, cu modificările și completările ulterioare constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor:
A - altor acte normative
B - Codului administrativ
C - Codului penal

79-Administrarea medicamentelor de către asistentul medical se face în condiții:
A - de dezinfecție
B - de igienă, asepsie și sterilizare
C - de igienă, asepsie, dezinfecție și menținerea normelor de control a infecțiilor

80-Avantajele sterilizării prin abur sub presiune sunt:
A - este cea mai puțin economică metodă de sterilizare
B - nu duce la corodarea instrumentelor metalice
C - distruge rapid și eficient toate microorganismele, inclusiv sporii și virusurile

81-Informațiile cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale:
A - se transmit Ministerului Sănătății
B - se transmit autorităților competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene prin alertă în cadrul IMI
C - nu există obligația de transmitere a acestor informații

82-Câte picături are 1 (un) gram de soluție apoasă:
A - 40-50 picături
B - 60-65 de picături
C - 20-25 picături

83-În angina pectorală, atitudinea terapeutică este:
A - nu se administrează oxigen
B - nu se administrează nitroglicerină
C - întreruperea tratamentului stomatologic

84-Care este prima manoperă întreprinsă în insuficiența respiratorie:
A - respirație artificială
B - asigurarea și menținerea libertății căilor respiratorii
C - oxigenoterapie

85-Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
A - au rezistență suficient de mare după amprentare
B - nu aderă pe suprafețele uscate
C - nu permit reinserția amprentei în cavitatea bucală

86-Tuberculul piriform ocupă:
A - zona centrală a bolții palatine
B - regiunea molarului de minte inferior
C - zona premolarilor mandibulari

87-În insuficiența renală cronică, în cabinetul de medicină dentară trebuie:
A - utilizarea șuntului arterio-venos
B - consult de specialitate
C - nu se face antibioterapie

88-Insulina se păstrează:
A - în congelator
B - în dulap de medicamente dar ferit de lumină
C - la rece (în frigider)

89-PLaca dentară-aspecte clinice:
A - se acumulează în zonele de autocurățire
B - nu este influențată de tipul alimentelor
C - se definește ca: depozitul dentar moale, neuniform și aderent la structurile cavității orale

90-Indicațiile extracției dinților temporari sunt la:
A - dinți temporari care împiedică erupția celor permanenți
B - dinți temporari fără mobilitate
C - dinți temporari cu carii incipiente

91-Clinic, tartrul se poate prezenta:
A - culoarea la maturare a tartrului este alb-gălbuie
B - tartrul supragingival, în treimea gingivală coronară, la frontali inferiori, lingual; la molarii superiori vestibular
C - în zonele dentare expuse unei masticații intense

92-Tumorile benigne au caracteristici generale:
A - evoluție rapidă, fulminantă
B - interesează ganglionii
C - nu recidivează după extirpare

93-Placa dentară generatoare de tartru dentar are următoarea caracteristică:
A - prin compoziția microbiană prezentă în placă pot fi generate cantități mari de tartru
B - nu este influențată de controlul mecanic al plăcii
C - nu este influențată de alimentație

94-Contraindicațiile rezecției apicale vizează:
A - dinții cu implantare compromisă
B - dinții pluriradiculari
C - pemolarii maxilari

95-Precizați care variantă este adevărată din următoarele enunțuri:
A - asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical nu sunt obligați să asigure îngrijirile de sănătate și tratamentele prescrise pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA
B - păstrarea confidențialității asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere și/sau tratament astfel de persoane
C - între specialiștii medico-sanitari, informațiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient nu trebuie să fie comunicate

96-Placa dentară-compoziție chimică:
A - se compune din 60% apă și 40% substanță uscată
B - se compune din 20% apă și 80% substanță uscată
C - se compune din 80% apă și 20% substanță uscată

97-Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:
A - prezența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular
B - prezența pH-urilor neutre
C - consum redus, rar, de glucide

98-Chisturile părților moi orale-chistul dermoid presupune:
A - adiție osoasă
B - antibioterapie
C - extirpare prin abordare orală/cutanată, în funcție de localizare

99-Momentul optim de programare a pacientei însărcinate este:
A - în primul trimestru al sarcinii
B - în cel de-al doilea trimestru al sarcinii
C - se va programa dimineața

100-Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:
A - consum redus, rar, de glucide
B - prezența pH-urilor acide
C - absența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular